

Zaai instructies

1

Dichtheid

Voor de meeste mengsels is 1 g/m² voldoende, maar doordat het weer steeds vaker grote extremen kent, kan het handig zijn om een iets hogere zaaidichtheid te kiezen. Tot gemiddeld maximaal 2 g/m².

2

Na de zomer

De rijpe zaden vallen natuurlijk na de zomer. De warme, vochtige bodem is voor meerjarige soorten ideaal voor kieming. Eenjarige soorten kunnen het beste tussen half maart en half mei worden gezaaid.

3

Het voorjaar

Eenjarige soorten kunnen het beste tussen half maart en half mei worden gezaaid. Er is beter niet na de langste dag gezaaid worden, de kans wordt daarna te groot dat veel planten niet meer tot bloei komen.

4

Berekening

Houdt met het moment van inzaaien rekening met of het wel of niet mogelijk is om water te geven.

5

Voorzaai

Bij voorjaarszaai kiemen onkruidzaden soms sneller. Gebruik de vals-kiembedmethode bij veel onkruidzaad.

6

Droogte

Zaai vroeg in het voorjaar als het weer dit toe laat om de negatieve gevolgen van een droge zomer te vermijden. Diep gewortelde kiemplantjes zijn beter bestand tegen droogte.

7

Spreading

In de natuur kiemen zaden nooit allemaal tegelijk. Onze niet veredelde zaden zijn niet veredeld en dus is deze natuurlijke spreading behouden.

8

Eisen

Met name 1-jarige soorten kiemen pas bij een voldoende warme bodem. Andere soorten hebben een koude periode nodig.

9

Timing

Zaai eenjarige bloemen niet na de langste dag om volledige bloei te garanderen.

10

Geduld

De kieming snelheid varieert sterk, van een week tot enkele maanden mede afhankelijk van het type zaad en het weer.

11

Meerjarig

Verwacht in het eerste jaar beperkte bloei. De echte pracht komt later.

12

Start schoon

Zaai in schone grond. Verwijder begroeiing en gebruik de vals-kiembedmethode bij onkruidzaad.